

Traubenproduktionsrichtlinien

Spätburgunder	Normal	Ortswein	Selektion
Pflanzgut	-	-	
Alter der Reben	-		10 Jahre
Mostgewicht (Zielwert)	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung	90 kg/ar darüber keine Vergütung	70 kg/ar darüber keine Vergütung
Lesezeitpunkt	-	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	vorgeschrieben
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1,20 m
Ausdünnen	-	-	Mengenkorrekturen sollten möglichst durch Traubenteilung erreicht werden. Trauben müssen im vorgegebenen Zeitraum halbiert werden.
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	kräftige Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	kräftige Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, KEIN: Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen	100% gesund, komplett ohne Botrytis, Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen	100% gesund, komplett ohne Botrytis, Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen

Traubenproduktionsrichtlinien

Riesling	Normal	Ortswein	
Pflanzgut	-	-	
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung	90 kg/ar darüber keine Vergütung	
Lesezeitpunkt	-	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband	
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 40-60 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	
Ausdünnen	-	-	
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden.	
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	

Traubenproduktionsrichtlinien

Weißburgunder	Normal	Ortswein	Selektion
Pflanzgut	-	-	-
Alter der Reben	-		10 Jahre
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung	90 kg/ar darüber keine Vergütung	70 kg/ar darüber keine Vergütung
Lesezeitpunkt	-	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	vorgeschrieben
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1,20 m
Ausdünnen	-	-	Mengenkorrekturen durch ausblasen oder manuelle Traubenteilung
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig
Qualität des Lesezugs	10% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	100% gesund, komplett ohne Botrytis, Oidium, Penicillium.

Traubenproduktionsrichtlinien

Grauburgunder	Normal	Ortswein	Selektion
Pflanzgut	-	-	-
Alter der Reben	-		10 Jahre
Mostgewicht	siehe Mostgewichtkorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung	90 kg/ar darüber keine Vergütung	70 kg/ar darüber keine Vergütung
Lesezeitpunkt	-	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	vorgeschrieben
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1,20 m
Ausdünnen	-	-	Mengenkorrekturen durch ausblasen oder manuelle Traubenteilung
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig
Qualität des Leseguts	10% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	100% gesund, komplett ohne Botrytis, Oidium, Penicillium.

Traubenproduktionsrichtlinien

Lemberger	Normal	Ortswein	
Pflanzgut	-	-	
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung	90 kg/ar darüber keine Vergütung	
Lesezeitpunkt	-	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband	
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 30-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m	
Ausdünnen	-	-	
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	kräftige Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Boden- bearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden	
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	100% gesund, komplett ohne Botrytis, Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen	

Traubenproduktionsrichtlinien

Schwarzriesling	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtkorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Auxerrois	Normal	Ortswein	
Pflanzgut	-	-	
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung	90 kg/ar darüber keine Vergütung	
Lesezeitpunkt	-	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband	
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 40-50 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m	
Ausdünnen	-	-	
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Boden- bearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden	
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	

Traubenproduktionsrichtlinien

Gewürztraminer	Normal	Ortswein	
Pflanzgut	-	-	
Alter der Reben	-	-	
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 kg darüber keine Vergütung	100 kg/ar darüber keine Vergütung	
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben	
Leseart	-	Handlese oder Vollernter mit Abbeerma-schine und Sortierband	
Düngung/Versorgung	-	Erhaltungsdüngung 40-60 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)	
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis	gute Fachliche Praxis	
Botrytizideinsatz	-	empfohlen	
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m	
Ausdünnen	-	-	
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden	moderate Entlaubung in der Traubenzone 2-3 Wochen nach der Blüte (Schrotkorngröße) Laubwand muss luftig gehalten werden. Kümmertriebe und Doppeltriebe müssen entfernt werden.	
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und geringen Ertrag abzustimmen. Bodenbearbeitung nach der Blüte nur nach Absprache. Unterstockbereich soll möglichst unkrautfrei gehalten werden	
Reifegrad	physiologische Reife	volle physiologische Reife evtl gestaffelte Lese notwendig	
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.	

Traubenproduktionsrichtlinien

Müller Thurgau	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 160 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Lesezugs	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Chardonnay	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	100 - 120 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine und Sortierband		
Düngung/Versorgung	Erhaltungsdüngung 40-60 kg N. Anlagen müssen gut versorgt sein (moderater Wuchs und Vitalität)		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Muskateller	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Trollinger	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Portugieser	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes Begrünungsmanagement.		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Regent	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Merlot	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtkorridore		
Ertrag	90 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Cabernet Sauvignon	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	70 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement</u> .		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Souvignier Gris	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Cabernet Mito	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	Lesetermin und Kelterhaus werden vorgegeben		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Biegedrahtabstand maximal 20cm Laubwandhöhe mindestens 1.20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Divers weiß	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	20% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		

Traubenproduktionsrichtlinien

Divers rot	Normal		
Pflanzgut	-		
Alter der Reben	-		
Mostgewicht	siehe Mostgewichtskorridore		
Ertrag	120 - 140 kg/ar darüber keine Vergütung		
Lesezeitpunkt	-		
Leseart	Handlese oder Vollernter mit Abbeermaschine		
Düngung/Versorgung	-		
Pflanzenschutz	gute Fachliche Praxis		
Botrytizideinsatz	-		
Erziehungsform	Flachbogen oder Schrägbogen. Pendelbogen erlaubt wenn technisch nicht anders möglich. Laubwandhöhe mindestens 1,20 m		
Ausdünnen	-		
Laubarbeiten	Laubwand muss nach guter fachlicher Praxis luftig gehalten werden		
Bodenbearbeitung	Bodenbearbeitung ist auf ein harmonisches Wachstum und normalen Ertrag abzustimmen. Zeitgerechtes <u>Begrünungsmanagement.</u>		
Reifegrad	physiologische Reife		
Qualität des Leseguts	5% Botrytis erlaubt, ansonsten frei von Oidium, Penicillium und sonstigen Erkrankungen.		